

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)  
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)  
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES (face à l'Hippodrome)  
C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL  
25 F.

Supplément n° 1 au Bulletin n° 81

14 Juin 1967

## AVERTISSEMENTS

### POMMIER-POIRIER

#### CARPOCAPSE -

Bien que des papillons soient sortis depuis déjà quelques semaines dans certaines zones, les premières pontes n'ont été déposées qu'au cours de la semaine écoulée. L'éclosion des oeufs est prévue d'ici 7 à 8 jours.

En conséquence, nous conseillons d'effectuer un traitement dès les premiers jours de la semaine prochaine.

#### TAVELURES -

Les contaminations par ascospores ne sont plus à craindre. Sur les variétés indemnes de Tavelure, il n'est donc pas nécessaire, pour le moment, d'appliquer un fongicide contre cette maladie. Par contre, sur celles présentant quelques taches, il conviendra de réaliser un traitement mixte.

### POMME DE TERRE

#### MILDIOU -

Dans le Finistère ainsi que dans la moitié nord des Côtes-du-Nord des taches apparaissent, fournissant une quantité non négligeable de conidies qui pourront occasionner des contaminations lors des prochaines pluies.

Dans la Manche et le Calvados des taches vont vraisemblablement être notées d'ici peu dans les zones les plus favorables à la maladie.

Nous estimons qu'un traitement s'impose dès le début de la semaine prochaine dans toutes ces régions, sur les variétés sensibles à cette maladie.

P.1.193

Dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la moitié sud des Côtes-du-Nord et l'Orne, le Mildiou est encore très rare et les risques de son extension très limités.

Dans ces régions, un traitement n'apparaît utile que dans les zones où le Mildiou cause régulièrement des dégâts, même par année peu favorable à ce champignon.

## INFORMATIONS

### POMME DE TERRE

#### DORYPHORE -

Au cas où des larves seraient observées, ajouter un insecticide à la bouillie anti-Mildiou.

### CAROTTE

#### PUCERONS -

De nombreux semis sont parasités par des pucerons (forte proportion de pucerons ailés qu'il ne faut pas confondre avec la Mouche de la carotte). Il convient de surveiller ces cultures et d'intervenir, si nécessaire, avec l'un des produits autorisés contre ces insectes.

### ECHALOTE ET PORTE GRAINES D'OIGNON

#### SELECTION SANITAIRE DES PIEDS-MERES -

C'est le moment de procéder à l'épuration des cultures réservées à la semence (élimination des plants virosés ou contaminés par des anguillules).

L'Ingénieur chargé des Avertissements  
Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,

J. DELOUSTAL.